

# ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐



กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## การเลี้ยงกระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ที่กินหญ้า ผักผลไม้ได้หลายชนิด ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่มาก ให้ผลผลิตเร็ว อาจจะเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่น หรือขุนขายก็ได้

### ประโยชน์การเลี้ยงกระต่าย

1. ให้ความเพลิดเพลิน
2. ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
3. เป็นอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกร
  - 3.1. ขยายลูก
  - 3.2. ขายเนื้อ
  - 3.3. เป็นสัตว์ทดลองและผลิตวัคซีนบางชนิด
  - 3.4. ผลพลอยได้ หนังส/มูล

### พันธุ์กระต่าย

#### 1. พันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์



#### ลักษณะประจำพันธุ์

- ขนสีขาวทั้งตัว
- ตาสีแดง
- หน้าสั้น สะโพกใหญ่ ไหล่กว้าง
- เนื้อแน่น
- ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง
- โตเต็มที่หนัก 4 – 5 กิโลกรัม
- เป็นกระต่ายพันธุ์เนื้อ

#### 2. พันธุ์แคลิฟอร์เนียไวท์



#### ลักษณะประจำพันธุ์

- ขนสีขาว พูยาว
- ปลายหูและปลายเท้าจะมีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม
- ตาสีแดง
- โตเร็ว
- เลี้ยงลูกเก่ง
- โตเต็มที่ หนัก 2.5 – 4 กิโลกรัม
- ใช้ทำพ่อแม่พันธุ์ หรือเป็นกระต่ายเลี้ยง

### 3. พันธุ์แองโกล่า



#### ลักษณะประจำพันธุ์

- ขนยาวตรงตรง มีสีหลายสี เช่น ขาว น้ำตาล เทา ดำ
- หน้าสั้น
- ตาสีดำ หรือน้ำตาล
- ให้ลูกน้อย ครอบละ 2 – 4 ตัว
- โตเต็มที่หนัก 1.8 – 2.5 กิโลกรัม
- เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเล่น

### 4. พันธุ์พื้นเมือง



#### ลักษณะประจำพันธุ์

- ขนสีน้ำตาล ดำ ขนสั้น
- ตาสีดำ
- ทนต่อโรคและสิ่งแวดล้อม
- ให้ลูกดก
- โตเต็มที่หนัก 2.5 – 3.5 กิโลกรัม
- เหมาะสำหรับทำพ่อแม่พันธุ์

### 2. โรงเรือน

- อยู่บนที่คั่นน้ำท่วมไม่ถึง
- อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- สามารถป้องกันศัตรู เช่น สุนัข แมว ได้
- กระจกกระด้ายควรทำด้วยลวดตาข่าย และอยู่สูงกว่าพื้น ไม่น้อยกว่า 50 ซม. เพื่อป้องกันกลิ่นปัสสาวะ

### 3. อาหารกระต่าย

1. อาหารหยاب คือ อาหารที่มีเยื่อใยสูง แต่มีโปรตีนต่ำ เช่น หญ้าสดผัก ผลไม้ ให้กระต่ายกินเป็นหลัก จำนวน 10 – 15 % ของน้ำหนักร่างตัว วันละ 2 มื้อ



หญ้ารูซี่



หญ้าขน



ลิสงเตา(ถั่วปิ่นโต)



ไมยราพยักษ์

#### ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงกระต่าย เนื่องจากมีสารมิมโมซิน ที่มีผลต่อขนกระต่ายทำให้ขนร่วงได้
2. หญ้าและผักที่ฉ่ำน้ำ เช่น เปียกฝน หรืออวบน้ำ จะทำให้กระต่ายท้องเสีย จึงควรนำหญ้าหรือผักสดไปผึ่งในที่ร่มประมาณ 3 – 6 ชั่วโมงก่อน หรือเกี่ยวหญ้าหลังเวลา 10.00 น.ไปแล้ว

2. **อาหารชั้น** คือ อาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบต่างๆ จนมีปริมาณ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินเกลือแร่ ฯลฯ ตามความจำเป็นในการเลี้ยงสัตว์แต่ละอายุ นิยมอาหารสำเร็จรูปสำหรับโค ให้กระต่าย กิน 120 - 180 กรัม/ตัว/วัน (จืด- จืดครึ่ง) เพื่อเสริมอาหารหยาบ

### โรคที่สำคัญของกระต่าย

#### 1. โรคหวัด

อาการ มีน้ำมูก จามบ่อย จมูกและเท้าหน้าเปียกชุ่ม

การป้องกัน อย่าให้กระต่ายถูกละอองฝนหรือลมโกรกจนเกินไป

การรักษา ให้กินยาซัลฟาเมท หรือฉีดยาออกซี 3 – 5 วัน

#### 2. โรคปอดบวม

อาการ หอบ มีน้ำมูกเขียว มักจะตายอย่างรวดเร็ว

การป้องกัน อย่าให้กระต่ายถูกละอองฝนหรือลมโกรกจนเกินไป

การรักษา ฉีดยาเพนนิซิลิน หรืออินฟลอกซาซิน 5 – 7 วัน

#### 3. อัมพาตอีกเสบ

อาการ อัมพาตบวมแดง ผสมพันธุ์ไม่ได้

การป้องกัน ไม่ผสมพันธุ์ถี่เกินไป (อาทิตย์ละ 3 ครั้ง) และหลีกเลี่ยงผสมพันธุ์กับแม่กระต่ายที่มีประวัติ เคยแท้งลูกมาก่อน

การรักษา ไม่มีการรักษา ควรคัดทิ้ง

#### 4. ตาอักเสบ

อาการ ตาบวมแดง แก้วตาเป็นฝ้าขาว บางครั้งหนังตาปลิ้น

การป้องกัน เมื่อกระต่ายเป็นหวัดรีบรักษาให้หาย

การรักษา รักษาอาการหวัด และหยอดตาด้วยยาป้ายตา หรือน้ำเกลือล้างแผล

#### 5. มดลูกอักเสบ

อาการ มีไข่ มีหนองออกจากช่องคลอด

การป้องกัน รั้งคลอดควรรนำมาทำความสะอาดและพันยาฆ่าเชื้อก่อนคลอด 7 วัน

การรักษา ไข่ยาสอดช่องคลอดและยาฉีด 3 – 5 วัน

#### 6. เต้านมอักเสบ

อาการ เต้านมบวมแดง ลูกท้องเสียและตาย

การป้องกัน ทำความสะอาดทรงและรั้งคลอดก่อนคลอด 7 วัน

การรักษา ฉีดยา 5- 7 วัน

## 7. ท้องเสีย

อาการ อุจจาระเหลวสีเขียว หรือมีมูกเลือด(บิด)

การป้องกัน งดอาหารชั้น หญาสดต้องผึ่งลมให้หมาดก่อน หรือให้หญาแห้งกิน ผสมยาปฏิชีวนะในน้ำกิน

การรักษา กินยาซัลฟาเมท หรือนิโคโนฟลอกซาซิน

## 8. ไรในหูและขี้เรื้อน

อาการ เกาหู ใบหูหนาและผิวหนังขรุขระ ขนบริเวณเล็บและจมูกกว้าง มีกลิ่น ถ้าเป็นมากจะตาย  
อาหารและตาย

การป้องกัน ซึ้อกระต่ายจากฟาร์มที่ปลอดโรคนี้ ฟันยามาขี้เรื้อนบริเวณกรง

การรักษา ฉีดไอโวนเมค หรือฟันทานควอน

## 5. การจัดการ

### 1. พ่อแม่พันธุ์

ควรผสมพันธุ์เมื่ออายุ 6 – 8 เดือน โดยสังเกตอาการเพศเมียที่พร้อมผสมพันธุ์คือ กระต่ายเห่า ส่งเสียงร้อง กระวนกระวาย ซึ้นขี้ตัวอื่น อวัยวะเพศบวมแดง น้ำเมือกเยิ้มแม่กระต่ายตั้งท้องนาน 31 – 35 วัน โดยก่อนคลอด 2 – 3 วัน จะกัดขนตัวเองวางไว้ในรังคลอด

### 2. ลูกกระต่าย

- แรกคลอดจะยังตาไม่เปิดละไม่มีขน แม่จะให้นมกินวันละ 2 – 3 ครั้ง จนอายุ 10 วัน ตาจึงจะเปิด ลูกกระต่ายอายุ 15 วันจะเริ่มออกจากรังกินอาหารได้

- กรณีแม่กระต่ายมีลูกมากเกินไป (10 ตัว) สามารถแบ่งลูกให้ตัวอื่นเลี้ยง โดยใช้มือไปลูบขนแม่กระต่ายตัวที่จะเอาลูกไปให้ แล้วมาจับลูกกระต่ายเอาไป เพื่อมิให้แม่ใหม่กัดลูกกระต่ายจากแม่อื่น

- ลูกกระต่ายหย่านมอายุ 1 เดือน

### 3. กระต่ายสาว

เมื่อกระต่ายอายุ 1 เดือน ควรตรวจเพศเพื่อแยกกระต่าย โดยการจับลูกกระต่ายหงายขึ้น เปิดดูอวัยวะเพศ ตัวผู้จะมีติ่งเนื้อยื่นออกมา





#### 4. กระท่ายรุ่น

แยกเพศผู้เพศเมีย คัดเลือกตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์ ไว้เพื่อทำพ่อแม่พันธุ์ หรือเลี้ยงขุนจนได้น้ำหนัก 2.2 – 2.8 กิโลกรัม เพื่อส่งตลาดต่อไป

#### ผลตอบแทน

##### ต้นทุน

● ค่าพ่อแม่พันธุ์กระท่าย(ผู้ 2 ตัว เมีย 8 ตัว) 10 ตัวๆละ 150 บาท	เงิน	1,500 บาท
● ค่ากรงกระท่าย ขนาด 4.80*0.60 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 2 หลัง	เงิน	5,000 บาท
● ค่าอาหารขี้	เงิน	4,680 บาท
● ค่ายาเวชภัณฑ์	เงิน	300 บาท
	รวมเป็นเงิน	<b>11,480 บาท</b>

##### รายได้

● แม่กระท่ายให้ลูก แม่ละ 5 ตัว ปีละ 4 ครอก ได้ลูกทั้งหมด 200 ตัว		
- จำหน่ายลูกกระท่ายอายุ 1 เดือน ตัวละ 80 บาท	เงิน	16,000 บาท
- หรือจำหน่ายกระท่ายขุน อายุ 6 เดือน (100 ตัว) ตัวละ 2 กก.ๆละ 70 บาท	เงิน	14,000 บาท
● มูลกระท่าย จำนวน 10 กระสอบๆละ 20 บาท	เงิน	200 บาท
	กำไร	<b>2,720 - 4,720 บาท</b>